Role of steroid used in the ED



ต้านการอักเสบ

- ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียนอกโรงพยาบาลที่มีอาการรุนแรง
- ปอดอักเสบติดเชื้อโควิดที่มีอาการรุนแรง

กดภูมิคุ้มกันของร่างกาย
เสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อน
ระดับน้ำตาลในโลหิตสูง
เลือดออกในทางเดินอาหาร
หัวใจเต้นเร็ว และความดันโลหิตสูง

กรณีได้รับยากระตุ้นกาเหดตัวของหลอดเลือด
norepinephrine ≥ 0.25 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที

- โรคหอบหืดกำเริบ
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ

- ภาวะแพ้แบบรุนแรง
- ภาวะกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ
- โรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก
- ภาวะสมองบวม
- ภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ
- ภาวะวิกฤติตีมหมวกไต

จัดทำโดยนายแพทย์ ปณตพันธ์ เพ็ชรน้ำสิน นายแพทย์ชำนาญการ